

# 敬偉牙醫診所

## 人工植牙手術同意書

為了充分了解植牙手術順利進行，向您說明植牙過程，並請您理解植牙可能遇的風險！

- 一、人工牙根植牙後通常需再經過一段時間的骨整合時間（視是否有做其它輔助性手術及病患的身體狀況而定）再進行第二階段手術後，接出支台齒製作假牙（或不需要第二次手術直接印模製作假牙）。
- 二、若您有系統性疾病如心臟病、糖尿病、高血壓、骨質疏鬆…等，必須告知醫師並控制好才適合進行手術。
- 三、植牙如同於自然牙齒並不適合咬太硬或過度重咬，也會因保養不當或服用某些藥物（治療骨質疏鬆的藥物，例如：福善美 Fosamax）造成植牙後人工牙根的損害。
- 四、植牙手術的成功率是無法百分之百，但根據國外長期且嚴謹的臨床追蹤報告，經五年使用後人工植體仍存在的比率約達80%~90%。
- 五、『術後人工植體使用年限減少之高危險群』（當植體已植入，但如有下列症狀亦可能有影響）一如罹患牙周病、糖尿病、抽煙（特別是重度抽煙者）、有磨牙習慣、吃檳榔、身體不好…等。
- 六、任何手術皆存在一定程度之風險性，包括術中、術後可能之暫時性或永久性之症狀。
- 七、一般性症狀如：傷口出血、傷口疼痛、傷口腫脹、傷口感染或癒合不良、局部麻醉風險、因併發症或手術效果不如預期，必要時需再度手術及其它治療。
- 八、特殊性症狀如：骨髓炎、蜂窩組織炎、口鼻竇相通、鼻竇炎、敗血症、皮下氣腫、臉頰部皮膚瘀血腫脹、顏面嘴唇下頷牙齒或舌頭暫時或永久性麻痺感、開口困難、口內疤痕形成、需要附加額外的手術或材料，包括軟或硬組織、植牙失敗，再度手術取出、在第二階段手術前，人工牙根可能提早外露而看得見、其它…等。
- 九、人工植牙替代方案如下：1、活動式假牙。2、固定性牙橋。
- 十、植牙後仍可能因個人口腔衛生習慣而導致植體周圍炎，造成植牙喪失無法使用。
- 十一、植體假牙裝置後仍需定期回診，一般建議半年回診一次，以維護植牙之使用。

醫療機構\_\_\_\_\_敬偉牙醫診所\_\_\_\_\_醫師\_\_\_\_\_

病患簽名欄\_\_\_\_\_日期\_\_\_\_\_



[鍵入文字]